

Guía
de las
AVES ACUÁTICAS y MARINAS
en la
Bahía de Santander



CHARRÁN COMÚN / COMMON TERN
Sterna hirundo



BAHÍA DE SANTANDER
ecoturismo y educación ambiental

ÍNDICE:

1 / LA BAHÍA DE SANTANDER	3
2 / AVES ACUÁTICAS Y MARINAS	4
3 / IMPORTANCIA ORNITOLÓGICA DE LA BAHÍA DE SANTANDER	5
4 / OBSERVACIÓN DE LAS AVES	6
5 / MANEJO DE ESTA GUÍA	7
6 / DESCRIPCIÓN DE ESPECIES	8
7 / LISTA DE AVES ACUÁTICAS Y MARINAS DE LA BAHÍA	22
8 / BIBLIOGRAFÍA	23
9 / DIRECCIONES DE INTERÉS	23

edita: Bahía de Santander. Ecoturismo.

autor: Carlos Sáinz Concha

© de la obra: BAHÍA DE SANTANDER. ECOTURISMO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.
www.bahiasantander.es

ilustraciones: Roberto Sánchez Vacas

diseño y maquetación: 7PIES 



IMPRESO EN PAPEL LIBRE DE CLORO, PROCEDENTE DE EXPLOTACIONES CONTROLADAS

1 / LA BAHÍA DE SANTANDER

- La Bahía de Santander es una amplia ensenada que mantiene comunicación con el mar Cantábrico a través de la bocana, entre la península de La Magdalena y el puntal de Somo y recibe aportes de aguas fluviales provenientes de la cuenca del río Miera y de las escorrentías de Heras, Solía y Boo.
- Esta bahía, situada en el centro del litoral de Cantabria, es una de las más grandes del Norte de España. Sus aguas bañan los municipios de Santander, Camargo, El Astillero, Villaescusa, Marina de Cudeyo y Ribamontán al Mar, a lo largo de **97 km.** de perímetro.
- En la actualidad cuenta con **22,4 km²**, aproximadamente la mitad de la extensión de la bahía original, debido a las acciones emprendidas por el hombre, que ha ido ocupando distintas zonas, principalmente las antiguas marismas, con fines urbanísticos, industriales, portuarios, de servicios y de ocio.
- La bahía está sujeta a la oscilación de las mareas, de tal forma que con las dos pleamares al día, el agua marina entra y sube el nivel, en ocasiones hasta **5 m.** y con las dos bajamares se retira y descubre amplios arenales y páramos de fango. Este trasiego de masas de agua favorece la entrada de numerosos organismos y materiales en suspensión y su posterior sedimentación, y a su vez, permite la exportación de otros materiales de origen continental y de los nutrientes y seres vivos generados por la propia bahía.
- A este modelo de corrientes de marea, se suma otro factor que caracteriza el sistema biológico de la bahía, es el encuentro de masas de agua con distinta salinidad y temperatura, propia de los estuarios. La mezcla de las aguas hace de trampa nutritiva y favorece la presencia de numerosos peces, moluscos, crustáceos, equinodermos, anélidos, plantas y algas.
- Como resultado, encontramos en la bahía ambientes litorales con gran valor ecológico que la convierten en un lugar atractivo para las aves acuáticas: los páramos intermareales de la Barquería, la Junquera y Raos, el complejo dunar del puntal de Somo, las islas, los fondos permanentemente sumergidos, y los humedales de La Marisma Blanca, Las Marismas de Alday y el Pozón de la Dolores.

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. coordenadas: 45° 25' N, 3° 46' W

- La bahía de Santander constituye el escenario en el que se localiza el Lugar de Importancia Comunitaria de la Red Ecológica Europea Natura 2000 "Dunas del Puntal y estuario del Miera", incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria.
- Con una superficie de **675 ha.**, el lugar está integrado por el sistema de dunas de El Puntal Somo-Loredo, la desembocadura del río Miera, a través de la ría de Cubas y las islas de Mouro y Santa Marina.
- En este atractivo paisaje de alto valor de conservación, encontramos diferentes hábitats de interés, como las dunas fijas y móviles, los bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda, la vegetación pionera de marisma y los brezales costeros.

2 / AVES ACUÁTICAS Y MARINAS

AVES ACUÁTICAS

- Entendemos por ave acuática la que se encuentra ligada a la presencia de agua, dulce, salobre y/o salada, ya sea en algún período de su ciclo vital o durante su totalidad, es decir, la que habita en humedales.
- Entre la gran variedad de aves acuáticas podemos destacar:

anátidas *Muy dependientes de los humedales costeros de la margen Oeste de la bahía de Santander, con aguas dulces y vegetación acuática. Hay ánades de superficie y buceadores.*

limícolas *Normalmente con patas y picos largos. Muy migradores y gregarios, la mayoría cría en la tundra y pasa el invierno en nuestras costas. Comunes en el estuario del Miera alimentándose de invertebrados marinos.*

gaviotas y charranes *Existen colonias de Gaviotas en algunas islas de la bahía, también de Charrán común y además ambos grupos aumentan su número y diversidad durante el período migratorio. Se alimentan básicamente de peces.*

garzas y espátulas *Invernantes y dispersivos. Pescan peces e invertebrados en aguas someras y quietas. Patas y cuello largos, picos en forma de puñal o espátula.*

somormujos y zampullines *Reproductores y migrantes parciales. Son buceadores e ictiófagos.*

rascones, gallinetas y fochas *Reproductores y migrantes parciales. Prefieren humedales con vegetación palustre densa.*

AVES MARINAS

- Las aves marinas pueden considerarse como acuáticas especialmente adaptadas a la vida en el mar. Están asociadas a las zonas más ricas en pesca; son migrantes y crían colonialmente en acantilados e islas. En la bahía podemos encontrar:

paiño *Sólo se acerca a tierra para criar, el resto del año vaga por los mares.*

alcas y araos *Buceadores e ictiófagos. Invernantes*

cormoranes *Dos especies, una más costera, el Cormorán Moñudo, reproductor en el entorno de la bahía; y otro más adaptado a los estuarios, el Cormorán grande, migrante.*

3 / IMPORTANCIA ORNITOLÓGICA DE LA BAHÍA DE SANTANDER

- Durante el período invernal la comunidad de aves acuáticas de la bahía de Santander concentra valores de abundancia y riqueza máximos, al igual que en el resto de humedales cantábricos.
- Alberga alrededor del **20 %** del total de aves acuáticas invernantes de Cantabria, llegándose a contabilizar más de **7.000 aves** de **55 especies**, en los meses de diciembre y enero. Hasta la fecha se han observado más de **100 especies**.
- Las gaviotas y los charranes son el grupo de aves dominante durante muchos meses, observándose la gran aportación de la Gaviota reidora a partir del mes de julio y posteriormente y en menor medida la Gaviota sombría y el Charrán patinegro. Éstas son especies migrantes e invernantes, que prácticamente desaparecen en época de nidificación, momento en el que sólo podemos observar a la residente Gaviota patiamarilla y al estival Charrán común.
- Otro grupo importante durante la invernada son las anátidas, destacando el Porrón europeo y la Cerceta común como las más numerosas en los humedales de la margen oeste de la bahía.
- Los limícolas muestran sus mayores abundancias también en invierno y en el paso prenupcial (abril y mayo). Destacan el Correlimos común, el Zarapito real, la Aguja colipinta y el Correlimos gordo.
- Las ardeidas están aumentando en los últimos años, tanto en número de ejemplares como de especies. En invierno son habituales las Garcillas bueyeras en las áreas de campiña circundantes a la bahía. También son numerosas las Garzas reales y las Garcetas comunes buscando alimento en las zonas intermareales.
- Por último entre las aves buceadoras destaca el Cormorán grande, sobre todo en invierno, el Somormujo lavanco como residente habitual y en menor medida los colimbo y las alcas.

REPRODUCCIÓN

- Hasta la fecha, contamos con **16 especies** de aves reproductoras en la bahía de Santander: Charrán común, Ostrero euroasiático, Gaviota patiamarilla, Halcón peregrino, Escribano palustre, Chorlitejo chico, Porrón europeo, Ánade azulón, Avetorillo común, Gallineta común, Focha común, Zampullín común, Rascón europeo, Paíño europeo, Somormujo lavanco y Cisne vulgar.

4 / OBSERVACIÓN DE LAS AVES

- La observación de aves es una actividad de ocio al aire libre que consiste en llevar a cabo inventarios de la avifauna, en diferentes lugares y territorios. Los ornitólogos guardan los registros de las aves que han detectado en cada jornada de campo, para con el tiempo, llegar a conocer a fondo el conjunto de las especies que habitan una localidad.
- La observación es una actividad que recompensa ampliamente a quien la practica, combina un moderado ejercicio físico con el intelectual, y pone en contacto nuestro espíritu con la naturaleza, ayudándonos a conocerla y protegerla.

CON QUÉ OBSERVAR AVES


- Los **prismáticos** son imprescindibles. Hay muchas opciones posibles, por lo que antes de adquirirlos tenemos que tener claros varios aspectos: aumento, campo de visión, luminosidad, peso, calidad de la óptica y precio. Lo más recomendable es empezar con unos **8 x 30** (8 aumentos, por 30 mm. de amplitud de campo).
- En una **guía de campo** encontramos las diferentes especies, siguiendo una clasificación zoológica, por órdenes, familias y géneros, y a cada especie con un texto descriptivo, una o varias ilustraciones y un mapa de distribución.
- Una **libreta de bolsillo** es también vital. Anotaremos fechas y horarios de los recorridos, condiciones meteorológicas, detalles sobre los tipos de hábitats visitados, y nombres y cifras de las especies observadas.

CÓMO SABER QUÉ AVES OBSERVAMOS

- Al ver un determinado pájaro, registramos mentalmente una serie de variables, que van desde marcas del plumaje, la forma general del cuerpo o sus partes más llamativas, (*el pico, cuello, patas, el tamaño, las actitudes, las voces...*). Las características que diferencian una especie de otra las denominamos **rasgos de campo**.

TOPONIMIA DE UN AVE

- Un buen conocimiento de la anatomía y el plumaje es sumamente valioso:



CUANDO OBSERVAR AVES

- Como hemos comentado, muchas de las aves que podemos observar en la bahía de Santander, crían en localidades situadas más al Norte, de tal forma que estas especies pasan una parte del año lejos de los territorios que les vieron nacer.
- Con la llegada del invierno, en el centro y norte de Europa, se reducen las horas de luz y la nieve oculta fuentes de alimento, lo que obliga a muchas especies a emprender el vuelo hacia lugares en los que abundan los recursos. Este fenómeno, que se conoce como **migración**, condiciona las observaciones temporal y espacialmente.
- En función de nuestras observaciones podemos aplicar las siguientes categorías a las aves de la bahía de Santander :

residente	<i>especie sedentaria que permanece todo el año.</i>
migrante	<i>especie que se encuentra en paso migratorio.</i>
invernante	<i>especie presente durante los meses de invierno.</i>
estival	<i>especie migrante que es reproductora.</i>



5 / MANEJO DE ESTA GUÍA

- El objetivo de esta obra es mostrar al observador las especies de aves acuáticas y marinas más comunes en la bahía de Santander.
- A cada especie se la denomina con su nombre común, nombre científico y nombre en inglés. Los textos se han elaborado con la intención de ayudar en la identificación de cada especie observada, destacando los rasgos de campo, el comportamiento más habitual, su alimentación y por último su estatus.
- Hay que señalar que las aves se han dibujado y descrito con el plumaje más frecuente que exhiben en la bahía de Santander, en su mayoría como invernantes.
- Así mismo, y debido a dimorfismo sexual de las anátidas, se ha decidido describir y dibujar a los machos, ya que son más fáciles de identificar.

6 / DESCRIPCIÓN DE ESPECIES

ZAMPULLÍN COMÚN / LITTLE GREBE

Tachybaptus ruficollis

Pequeño y regordete. Pico corto y popa algodonosa. Bucea frecuentemente en busca de invertebrados acuáticos, caracillos y peces. Residente en los humedales de la margen oeste de la bahía a los que se suman ejemplares invernantes.



SOMORMUJO LAVANCO / GREAT CRESTED GREBE

Podiceps cristatus



Tamaño como los patos pero más estilizado, con el cuello largo siempre blanco y pico prominente. En plumaje nupcial con característicos "moños" negros y "golas" rojizas en la cabeza. Cría en el Pozón de la Dolores. Gran buceador, se alimenta de peces. Residente e invernante.

ZAMPULLÍN CUELLINEGRO / BLACK-NECKED GREBE

Podiceps nigricollis

Mayor que el Zampullín común y con el cuello más largo. Frente empinada y pico ligeramente curvado hacia arriba. En invierno de color blanco y negro, con la cara blanca. Se alimenta de insectos acuáticos, moluscos y renacuajos. Gran nadador y buceador. Invernante.





PAIÑO EUROPEO / EUROPEAN STORM-PETREL

Hydrobates pelagicus

Pequeño, no supera el tamaño de la golondrina, oscuro y con el obispillo blanco. Al comer, golpea el agua con sus patas en busca de macroplancton y levanta las alas. Pelágico, sigue a los barcos. Residente en las cavidades de la isla de Mouro.

CORMORÁN GRANDE / GREAT CORMORANT

Phalacrocorax carbo

Ave de color negro y aspecto robusto, con cuello y cabeza grande. Los jóvenes con el vientre pálido. A menudo se le encuentra descansando con las alas abiertas. Se alimenta de peces que persigue buceando, a veces en grupo. Invernante y migrante.



CORMORÁN MOÑUDO / EUROPEAN SHAG

Phalacrocolax aristotelis

Menor y más esbelto que el anterior, en época de cría con penacho en la cabeza. Vuela a ras de agua con el cuello estirado. Propio de acantilados e islotes marinos donde establece colonias. Habitualmente posado en la isla de Corvera. Residente en Cabo Quintres.

GARCILLA BUEYERA / CATTLE EGRET

Bubulcus ibis

Ardeida de pequeño tamaño, muy blanca con áreas anaranjadas en plumaje nupcial. Se alimenta de insectos entre el ganado que pasta en los prados. Muy gregaria. Forma un dormidero con alrededor de 2.000 ejemplares en las Marismas de Alday. Invernante y migrante.



GARCETA COMÚN / LITTLE EGRET

Egretta garzetta

Más esbelta y grande que la G. bueyera, elegante, con pico y patas negras y pies amarillos. Bastante común en los páramos intermareales alimentándose de peces, insectos y otros invertebrados acuáticos. Invernante y migrante.



GARZA REAL / GREY HERON

Ardea cinerea

Es la garza grande más común, de color gris, cabeza blanca y negra y pico recto y poderoso. Vuelo pausado, con el cuello recogido y las patas sobresaliendo de la cola. Espera pacientemente a su presa inmóvil. Población en aumento, con reproductores en el entorno del embalse del Ebro. Invernante y migrante.





ESPÁTULA COMÚN / EURASIAN SPOONBILL

Platalea leucorodia

Inconfundible, blanca, grande y con el pico largo en forma de espátula. A diferencia de las garzas, vuela con el cuello extendido. Se alimenta en aguas poco profundas con barridos laterales del pico. Migrante, con pasos de aves procedentes de Holanda y Francia en primavera y otoño.

CISNE VULGAR / MUTE SWAN

Cygnus olor

Anátida muy grande de color blanco, con el cuello largo y elegante y cabeza pequeña. Para alzar el vuelo coge carrerilla con fuertes aleteos. Se alimenta de vegetales acuáticos, plancton, caracolillos y pequeños anfibios. Residente habitual en diferentes humedales de la bahía desde el año 2001.



SILBÓN EUROPEO / EURASIAN WIGEON

Anas Penelope



Pato mediano, de cabeza redondeada y cola puntiaguda. Los machos más vistosos, con la frente dorada, el pecho rosa y el resto del cuerpo gris pardusco. Vegetariano, come bulbos, hierba y rizomas. Invernante y migrante, formando bandos de hasta 500 ex. en la ensenada de San Bartolomé.

ÁNADE FRISO / GADWALL

Anas strepera

Plumaje poco llamativo, los machos pardo-grisáceos con la popa negra, las hembras pardas. Llamativo espejuelo blanco. Se alimenta de hojas, tallos y semillas de plantas acuáticas, también pasta en las orillas. Unos pocos residentes en los humedales de la bahía, su número aumenta con la llegada de invernantes.



ÁNADE AZULÓN / MALLARD

Anas platyrhynchos

El pato más común, grande, con espejuelo azul. Los machos con cabeza verde, pecho pardo, resto del cuerpo gris pálido y popa negra. Vive en todo tipo de humedales. Es omnívoro y nidifica en tierra, escondido entre la vegetación. Residente e invernante.



ÁNADE RABUDO / NORTHERN PINTAIL

Anas acuta

Estilizado, con la cola larga y puntiaguda. Macho inconfundible, con cabeza y cuello color chocolate, dorso y flancos gris, popa negra y crema. Come vegetales e invertebrados acuáticos sumergiendo la cabeza en el agua. Migrante, con bandos de hasta un centenar de ejemplares.



CUCHARA COMÚN / NORTHERN SHOVELER

Anas clypeata



Pato mediano con pico llamativamente largo y ancho. Macho con cabeza oscura, vientre blanco y flancos pardo-rojizos.

Filtra del agua pequeños crustáceos, insectos y semillas. Prefiere aguas dulces con abundante vegetación. Invernante.

CERCETA COMÚN / COMMON TEAL

Anas crecca

Es el más pequeño de nuestros patos nadadores. Macho con cabeza pardo-rojiza y antifaz verde. Pupa con llamativo triángulo amarillo y espejuelo verde.

Vuelo bajo y rápido. Omnívora.

Invernante, sus concentraciones superan el millar de ejemplares en el Pozón de la Dolores.



PORRÓN EUROPEO / COMMON POCHARD

Aythya ferina



Pato buceador mediano, con cabeza puntiaguda y pico largo. El macho gris con la cabeza castaña y proa y popa negras. Le gustan los humedales de profundidad media con abundante vegetación subacuática. Residente escaso e invernante común en los humedales de la bahía.

ÁGUILA PESCADORA / OSPREY

Pandion haliaetus

Rapaz grande, muy blanca por debajo, con alas largas y muy anguladas. Cabeza blanca con antifaz oscuro. Dorso pardo-oscuro. Se cierne con profundos aleteos y se tira a pescar desde lo alto. Acostumbra a comer posada en postes o rocas. Invernante habitual en la Bahía.



GALLINETA COMÚN / COMMON MOORHEN

Gallinula chloropus



Oscura con llamativa popa blanca y negra en continuo movimiento. Escudete rojo con la punta del pico amarillo. En tierra similar a la gallina, al nadar cabecea. Se alimenta de plantas, semillas y animalillos acuáticos. Residente en todos los humedales de la bahía.

FOCHA COMÚN / EURASIAN COOT

Fulica atra

Algo mayor que la Gallineta, con el pico y escudete blanco. Levanta el vuelo "corriendo" por encima del agua. En época reproductora es muy territorial y reclama a menudo. Omnívora, nadadora y buceadora. Residente común a los que se suman ejemplares invernantes.



OSTRERO EUROASIÁTICO / EURASIAN OYSTERCATCHER

Haematopus ostralegus



Grande y compacto, con plumaje muy contrastado negro y blanco y pico largo rojo. Se alimenta de bivalvos y otros invertebrados. Frecuenta los páramos intermareales del estuario del Miera. Residente escaso en la isla de Santa Marina e invernante.

AVOCETA COMÚN / PIED AVOCET

Recurvirostra avosetta

Elegante, plumaje blanco con zonas negras, pico largo y curvado hacia arriba. Cuando se alimenta, balancea la cabeza de un lado al otro buscando invertebrados en la superficie del agua. Paso migratorio de ejemplares del norte de Europa.



CHORLITEJO GRANDE / COMMON RINGED PLOVER

Charadrius hiaticula



Limícola compacto con el pico corto. Vientre blanco, dorso marrón y "collar" oscuro. Franjas alares blancas, muy llamativas en vuelo. Al alimentarse, miran, corren y pican en los páramos intermareales. Migrante.

CHORLITO GRIS / GREY PLOVER

Pluvialis squatarola

Limícola mediano con pico corto. En invierno plumaje gris oscuro. Se reproduce en el ártico. Durante el paso se le observa en la línea de costa, normalmente solo. Se alimenta de gusanos marinos, moluscos y crustáceos. Migrante.



AVEFRÍA EUROPEA / NORTHERN LAPWING

Vanellus vanellus

Fácil de reconocer, blanco y negro, aunque el dorso en realidad es verde, llamativo copete. Llega con olas de frío, forma bandos grandes sobrevolando los prados costeros. Se alimenta de todo tipo de invertebrados. Invernante y migrante.

CORRELIMOS COMÚN / DUNLIN

Calidris alpina

Limícola pequeño, gris y poco distintivo, con vientre blanco y ceja clara. Bandos grandes y apretados en vuelo. Localiza invertebrados recorriendo frenéticamente los páramos de la bahía. Migrante común.





AGUJA COLIPINTA / BAR-TAILED GODWIT
Limosa lapponica

Limícola con pico largo ligeramente curvado hacia arriba, tibias cortas, y plumaje pardo, estriado en el dorso. Recorre los páramos intermareales introduciendo el pico en el fango en busca de invertebrados acuáticos. Migrante.

ZARAPITO REAL / EURASIAN CURLEW
Numenius arquata

El mayor de nuestros limícolas, con el pico muy largo y curvado hacia abajo. Pardo gris, con el obispillo blanco en vuelo. Se oyen habitualmente sus silbidos de largo alcance, aflautados y melancólicos. Invernante común en la bahía con ejemplares de centro Europa.



ZARAPITO TRINADOR / WHIMBREL
Numenius phaeopus

Menor que el anterior, con pico y patas más cortas. Píleo con dos listas laterales oscuras. Cría en Islandia y Norte de Europa. Se le observa en los pasos (entre abril y mayo, y septiembre y noviembre) alimentándose en los páramos del estuario del Miera. Migrante.



ARCHIBEBE COMÚN / COMMON REDSHANK

Tringa totanus

Limícola mediana con patas y base del pico rojos. Marrón grisáceo por encima. En vuelo, borde posterior del ala blanco brillante. Siempre alerta, emite un reclamo musical de alarma insistentemente. Migrante.



ANDARRÍOS CHICO / COMMON SANDPIPER

Actitis hypoleucos

Limícola con dorso marrón y vientre blanco, patas cortas y cola larga. Mueve constantemente la parte posterior del cuerpo al posarse sobre estructuras rígidas. Vuelo con alternancia de aleteos espasmódicos y cortos planeos a ras de agua. Invernante común y migrante.



VUELVEPIEDRAS / RUDDY TURNSTONE

Arenaria interpres

Limícola mediana y robusta, con patas naranjas y banda pectoral oscura que resalta sobre vientre blanco. Dorso marrón-gris oscuro. Levanta piedras, algas y conchas para obtener sus presas. Invernante y migrante.





GAVIOTA REIDORA / BLACK-HEADED GULL

Larus ridibundus

Gaviota pequeña, dorso gris y puntas de las alas negras. Cabeza blanca con una mancha color chocolate en las auriculares en invierno. Forma bandos bastante ruidosos en las rías de la bahía, donde se alimenta. Presente casi todo el año, se ausenta los meses de cría. Invernante y migrante.

GAVIOTA PATIAMARILLA / YELLOW-LEGGED GULL

Larus michahellis

Grande con el dorso gris y puntas de las alas negras. Pico y patas amarillas. Omnívora, se alimenta en los puertos pesqueros y también en los núcleos urbanos. Residente común en las islas de Mouro y Santa Marina.



GAVIOTA SOMBRÍA / LESSER BLACK-BACKED GULL

Larus fuscus



Algo menor que la patiamarilla, con el dorso mucho más oscuro. Pico y patas amarillas. Se alimenta en los páramos de la bahía. Invernante común y migrante con ejemplares a menudo procedentes de Inglaterra.

CHARRÁN PATINEGRO / SANDWICH TERN

Thalasseus sandvicensis

Ave costera de tamaño medio, esbelta, con el pico negro en la base y punta amarilla. En vuelo se le ve muy blanca, sólo destaca el píleo negro. Se alimenta haciendo vertiginosos picados sobre el mar en busca de peces. Invernante habitual en la bahía y migrante.



CHARRÁN COMÚN / COMMON TERN

Sterna hirundo

Algo más pequeño que el Charrán patinegro, con las patas rojas y el pico rojo con la punta negra. Se cierne y zambulle para pescar alevines de peces.

Muy ruidoso y territorial en la colonia de cría. Residente en la bahía desde 1989, siendo éste el único lugar del Norte de la península donde se reproduce.



ARAO COMÚN / COMMON GUILLEMOT

Uria aalge



Ave marina color chocolate oscuro, con el pico fino y puntiagudo. En invierno tiene las "sienes" blancas con una línea oscura que las cruza y el vientre siempre blanco. Como los pingüinos tiene las patas retrasadas y es un experto buceador. Migrante procedente de las Islas Británicas princ. Se refugia en la bahía de los temporales de invierno.

ALCA COMÚN / RAZORBILL

Alca torda

Más oscura y robusta que el Arao común, con el pico ancho, romo y aplanado por los laterales. Cola más larga y a menudo levantada al nadar. Se alimenta principalmente de peces. Migrante.



MARTÍN PESCADOR / COMMON KINGFISHER

Alcedo atthis



Ave pequeña y compacta, con la cabeza y el pico grandes. Colores muy vivos, dorso azul turquesa y vientre naranja. Se suele posar en ramas sobre el agua desde donde se zambulle para pescar. En vuelo es característico su reclamo agudo y penetrante chiii. Invernante y migrante.

7 / LISTA DE LAS AVES ACUÁTICAS Y MARINAS DE LA BAHÍA DE SANTANDER

leyenda CARÁCTER: I: Invernante / M: Migrante / R: Residente / E: Estival

NOMBRE COMÚN	Nombre científico	NOMBRE INGLÉS	FRECUENCIA	CARÁCTER
Colimbo grande	<i>Gavia immer</i>	Great northern diver	Raro	M
Zampullín común	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Little grebe	Común	R, I
Somormujo lavanco	<i>Podiceps cristatus</i>	Great crested grebe	Común	R, I
Zampullín cuellinegro	<i>Podiceps nigricollis</i>	Black-necked grebe	Escaso	M
Paño europeo	<i>Hydrobates pelagicus</i>	European storm-petrel	Raro	R
Cormorán grande	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Great cormorant	Abundante	I, M
Cormorán moñudo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	European shag	Común	R
Avetorillo común	<i>Ixobrychus minutus</i>	Little bittern	Raro	E
Garcilla bueyera	<i>Bubulcus ibis</i>	Cattle egret	Abundante	I, M
Garceta común	<i>Egretta garzetta</i>	Little egret	Común	I, M
Garza real	<i>Ardea cinerea</i>	Grey heron	Común	I, M
Garza imperial	<i>Ardea purpurea</i>	Purple heron	Escaso	E
Espátula común	<i>Platalea leucorodia</i>	Eurasian spoonbill	Escaso	M
Ánsar común	<i>Anser anser</i>	Greylag goose	Raro	M
Cisne vulgar	<i>Cygnus olor</i>	Mute swan	Abundante	R
Silbón europeo	<i>Anas penelope</i>	Eurasian wigeon	Escaso	I, M
Ánade friso	<i>Anas strepera</i>	Gadwall	Escaso	R, I
Ánade azulón	<i>Anas platyrhynchos</i>	Mallard	Común	R, I
Ánade rabudo	<i>Anas acuta</i>	Northern pintail	Escaso	I, M
Cuchara común	<i>Anas clypeata</i>	Northern shoveler	Común	I, M
Cerceta común	<i>Anas crecca</i>	Common teal	Común	I, M
Porcón europeo	<i>Aythya ferina</i>	Common pochard	Común	R, I
Negrón común	<i>Melanitta nigra</i>	Common scoter	Raro	I
Serreta mediana	<i>Mergus serrator</i>	Red-breasted merganser	Raro	M
Aguila pescadora	<i>Pandion haliaetus</i>	Osprey	Escaso	I
Rascón europeo	<i>Rallus aquaticus</i>	Water rail	Escaso	E
Gallineta común	<i>Gallinula chloropus</i>	Common moorhen	Común	R
Focha común	<i>Fulica atra</i>	Eurasian coot	Abundante	R, I
Ostrero euroasiático	<i>Haematopus ostralegus</i>	Eurasian oystercatcher	Escaso	R, I
Avoceta común	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Pied avocet	Raro	M
Alcaraván común	<i>Burhinus oedipnemus</i>	Stone-curlew	Escaso	I
Chorlitejo chico	<i>Charadrius dubius</i>	Little ringed plover	Escaso	E, M
Chorlitejo grande	<i>Charadrius hiaticula</i>	Common ringed plover	Escaso	I, M
Chorlito gris	<i>Pluvialis squatarola</i>	Grey plover	Escaso	M
Avefría europea	<i>Vanellus vanellus</i>	Northern lapwing	Común	I, M
Correlimos común	<i>Calidris alpina</i>	Dunlin	Común	I, M
Correlimos gordo	<i>Calidris canutus</i>	Red knot	Escaso	M
Agachadiza común	<i>Gallinago gallinago</i>	Common snipe	Escaso	M
Aguja colinegra	<i>Limosa limosa</i>	Black-tailed godwit	Escaso	M
Aguja colipinta	<i>Limosa lapponica</i>	Bar-tailed godwit	Escaso	I, M
Zarapito real	<i>Numenius arquata</i>	Eurasian curlew	Común	I, M
Zarapito trinador	<i>Numenius phaeopus</i>	Whimbrel	Escaso	M
Archibebe común	<i>Tringa totanus</i>	Common redshank	Escaso	M
Archibebe claro	<i>Tringa nebularia</i>	Common greenshank	Escaso	I, M
Andarrios chico	<i>Actitis hypoleucos</i>	Common sandpiper	Común	I, M
Vuelvepedras	<i>Arenaria interpres</i>	Ruddy turnstone	Común	I, M
Gaviota reidora	<i>Larus ridibundus</i>	Black-headed gull	Abundante	I, M
Gaviota patiamarilla	<i>Larus michahellis</i>	Yellow-legged gull	Abundante	R
Gaviota sombría	<i>Larus fuscus</i>	Lesser black-backed gull	Abundante	I, M
Gavión atlántico	<i>Larus marinus</i>	Great black-backed gull	Escaso	M
Charrán patinegro	<i>Thalasasseus sandvicensis</i>	Sandwich tern	Común	I, M
Charrán común	<i>Sterna hirundo</i>	Common tern	Escaso	E
Arao común	<i>Uria aalge</i>	Common guillemot	Raro	M
Alca común	<i>Alca torda</i>	Razorbill	Raro	M
Martín pescador	<i>Alcedo atthis</i>	Common kingfisher	Escaso	I, M

8 / BIBLIOGRAFÍA

Bahillo, M & Alonso, I. (1998)
Fauna de Cantabria: aves acuáticas y marinas
Ed. Cantabria Tradicional.

De Juana, E & Varela, J.M. (2000)
Guía de las aves de España
Ed. Lynx Edicions. Barcelona.

Jonsson, L. (1994)
Aves de Europa, con el norte de África y Oriente Medio
Ed. Omega. Barcelona.

Mullarney, K; Svensson, L; Zetterström, D & Grant, P.J. (2001)
Guía de aves de España y de Europa
Ed. Omega. Barcelona.

Martí, R. & Del Moral, J.C. (Eds.). (2002)
La invernada de aves acuáticas en España
Dcción. Gral. de Conservación de la Naturaleza-SEO/BirdLife. Ed. Organismo
Autónomo Parques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.

Martí, R. & Del Moral, J.C. (Eds.). (2003)
Atlas de las Aves reproductoras de España
Dcción. Gral. de Conservación de la Naturaleza-SEO/BirdLife. Madrid.

Saiz Villoria, J. (1999)
Aves de Cantabria
Ed. Creática Ediciones. Santander.

9 / DIRECCIONES DE INTERÉS

BAHÍA DE SANTANDER. ECOTURISMO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Camilo Alonso Vega, 4 · 39007 · Santander · T.: 630 258 513
carlos@bahiasantander.es · www.bahiasantander.es

Dirección General de Biodiversidad. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad. Gobierno de Cantabria.
Rodríguez 5, 3º · 39002 · Santander · T.: 942 207 593
www.gobcantabria.es

SEO/BirdLife. Delegación de Cantabria.
Avda. de Chiclana, 8 · 39610 · El Astillero · Cantabria · T.: 942 223 351
cantabria@seo.org · www.seo.org

LUGARES DE INTERÉS PARA LA OBSERVACIÓN DE AVES ACUÁTICAS Y MARINAS EN LA BAHÍA DE SANTANDER

- | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 Cabo Mayor | 6 Puerto Deportivo | 11 Muelle de Pedreña |
| 2 Playa del Camello | 7 Marismas Blancas | 12 Puente de Somo |
| 3 Estación Marítima | 8 Pontejos | 13 El Puntal |
| 4 Dársena sur de Raos | 9 El Urro | 14 Isla de Santa Marina |
| 5 Marismas de Alday | 10 La Junquera | 15 Isla de Mouro |

